Joint involvement in Early Rheumatoid Arthritis



Joint	% Patients
MCP, PIP	90
Wrists	80
Knees	65
Shoulders	65
Ankles	50
Feet	45
Elbows	40
Hips	20

www.fisiokinesiterapia.biz

AR: Dolore articolare

- Presente a riposo con rigidità mattutina > 30 minuti
- Presente alla pressione esercitata sulle articolazioni interessate
- Talora esacerbato da particolari movimenti (es. spalla)

AR: Tumefazione articolare

- Tumefazione dei tessuti molli apprezzabile lungo i margini dell’articolazione
- Se presente versamento = tumefazione
- Non deve essere considerato tumefazione né una deformazione ossea, né un edema sovrastante l’articolazione
- La fluttuazione è la caratteristica semeiologica principale della tumefazione
- La presenza di tumefazione può influenzare la mobilità articolare (spalla, polso)

Articolazioni della mano interessate nell’AR



www.fisiokinesiterapia.biz



Valutazione clinica del versamento
InterFalangeaProssimale:

mano esaminata estesa
utilizzare pollice ed indice di entrambe le mani



Valutazione clinica del versamento MetaCarpoFalangea :
mano esaminata estesa
utilzzare entrambi i pollici + le restanti dita come supporto



Ecografia articolare con Power-Doppler





Versamento articolare

piccole articolazioni mano

Sinovite iperplastica (piccole articolazioni)





Sinovite di polso