


www.fisiokinesiterapia.biz


**LA PROTESI INVERSA: QUANDO E COME LA
REVISIONE?**

RISULTATI

CONSTANT SCORE PRE-OP vs POST-OP (1 anno)




■ PRE-OP
■ POST-OP



*De Cupis V.; Chillemi C.; Marinelli M.;
"Orthopedics May 2008*

RISULTATI

CONSTANT SCORE



*De Cupis V.; Chillemi C.; Marinelli M.;
"Orthopedics May 2008*

LE COMPLICANZE INTRA E POST-OPERATORIE DELLA PROTESI INVERSA

Complications during shoulder arthroplasty are not
as uncommon as it was thought initially

G. Walch, 2003



COMPLICANZE INTRAOPERATORIE

I MODELLO



2 componenti (da cementare):
OMERALE: POLIETILENE
GLENODEA: METALLO O CERAMICA
(2/3 di sfera, Ø 42 mm)


Grammont P. - 1985

COMPLICANZE POST-OPERATORIE

COMPLICANZE INTRAOPERATORIE:

**A)FRATTURE DIAFISARIE DELL'OMERO LA
MAGGIOR PARTE NELLE REVISIONI
(RIMOZIONE DEL CEMENTO)**



SINTESI CON CERCHIAGGI O PLACCA



COMPLICANZE INTRAOPERATORIE:

B) FRATTURA INTRAOPERATORIA DELLA GLENA (REAMING)

INNESTO OSSEO ED IMPIANTO DELLA GLENA IN UN SECONDO TEMPO



COMPLICANZE POSTOPERATORIE:

B) COMPLICAZIONI OMERALI (FRATTURE
E/O SCOLLAMENTO) **2,4%**

LA SOLUZIONE DELLA FRATTURA E'
CRUENTA ED INCRUENTA



COMPLICANZE POSTOPERATORIE:



C) COMPLICAZIONI GLENOIDEE **2,1%**

(SCOLLAMENTO DELLA GLENOIDE
(NOTCHING) O DISASSEMBLAGGIO (FINO
AL 1995)



COMPLICANZE POSTOPERATORIE:

D) INFEZIONE 3%




COMPLICANZE POSTOPERATORIE:

E) FRATTURE DELLA SPINA DELLA SCAPOLA

F) COMPLICANZE NEUROLOGICHE (NERVO ASCELLARE)



G) TROMBOSI VENOSA

0,5%




COMPLICANZE

LA PERCENTUALE DI COMPLICANZE NELLA
PROTESI INVERSA NELLA NOSTRA
CASISTICA E' DEL **14%** CON PERCENTUALE
DI REVISIONE DEL **10%** DI CUI LA CAUSA
MAGGIORE E' L'INSTABILITA'



*De Cupis V.; Chillemi C.; Marinelli M.;
"Orthopedics May 2008"*

CASO CLINICO




CASO CLINICO




www.fisiokinesiterapia.biz

CASO CLINICO




CASO CLINICO



CASO CLINICO





CASO CLINICO




CASO CLINICO



CASO CLINICO



CASO CLINICO



CASO CLINICO



www.fisiokinesiterapia.biz

COMPLICANZE

NELLE REVISIONI PROTESICHE LE
COMPLICAZIONI INTRAOPERATORIE
AVVENGONO NELL'**8,5%** DEI CASI E LA
MAGGIOR PARTE DI QUESTE E' RELATIVA
ALL'ESTRAZIONE DI UNA COMPONENTE
PROTESICA (CEMENTATA O NO).

LA PERCENTUALE DI COMPLICANZE POST-
OPERATORIE E' DEL **17,1%**

*G. WALCH, B. WALL, F. MOTTIER (NICE
SHOULDER COURSE 2006)*

COMPLICANZE POSTOPERATORIE:



H) INSTABILITA' (CAUSA PIU' FREQUENTE
DI REVISIONE 19%)



*Wall B.; Novè Jossierand L.; O'Connor P.; Bradley
Edwards P.; G. Walch. " J.BONE JOINT SURG.
(Am.) 2007*

COMPLICANZE

L'ALTA PERCENTUALE DI INFEZIONI NEGLI IMPIANTI PRIMARI (2,2%) E NELLE REVISIONI (6,4%) DEVE ESSERE UN PUNTO DI PARTENZA PER PROSSIMI STUDI.



Coste J.S., Reig S., Troyani C., Berg M., Walch G., Boileau P. " J.BONE JOINT SURG. (BR.) 2004"