

IPERCIFOSI DORSALE


VALORI NORMALI DELLA CIFOSI
DORSALE 20/25°- 40/45°

- PERCIFOSI IDIOPATICA O POSTURALE
- MALATTIA DI SCHEURMANN (1-8%)
- CIFOSI DORSOLOMBARE E LOMBARE

www.fisiokinesiterapia.biz

MALATTIA DI SCHEUERMANN

- TRE VERTEBRE ADIACENTI INCUNEATE ALMENO 5° OGNUNA



M. DI SCHEUERMANN

● LIEVE

MENO DI 50°

● MEDIA

50°-70°

● GRAVE

OLTRE I 50°

M. DI SCHEURMANN

ETIOLOGIA

EREDITARIETA' (CARTILAGINE)

CAUSA MECCANICA

M. DI SCHEUERMANN CLINICA

- DOLORE DORSALE (ADOLESCENTE)
CERVICALE E LOMBARE (ADULTO)
- COMPROMISSIONE ESTETICA
- **RARISSIME** COMPROMISSIONI
CARDIOVASCOLARI E NEUROLOGICHE

IPERCIFOSI TRTTAMENTO CINESITERAPICO

- CURVE 45-50°
- AUTORIDUCIBILITA'
- IPERCIFOSI ESTESA ED ARMONICA
- IGIENE POSTURALE



www.fisiokinesiterapia.biz

IPERCIFOSI TRATTAMENTI ORTESICI

CURVE DI 50-70°

CURVE+O- RIGIDE; TEST ESTENSIONE
DA PRONO

CORSETTI AMOVIBILI

CORSETTI INAMOVIBILI


IPERCIFOSI

TRATTAMENTO ORTESICO

CORSETTI AMOVIBILI


- LIONESE, LAPADULA, MAGUELONE
- INCOMPLETA RIDUCIBILITA' DELLA CURVA
- M. DI SCHEUERMANN
- TEMPO PIENO PER 18-24 MESI
- SVEZZAMENTO PROGRESSIVO

CORSETTO LIONESE





CORSETTO LA PADULA PER DORSO CURVO










www.fisiokinesiterapia.biz

CORSETTO MAGUELONE








IPERCIFOSI

TRATTAMENTO ORTESICO

ORTESI INAMOVIBILI IN VETRORESINA

- IPERCIFOSI DORSALI RIGIDE
- M. DI SCHEUERMANN IN FASE EVOLUTIVA
- 2-3 CORSETTI PER 3-4 MESI PER UN TOTALE DI 6-12 MESI

CORSETTO INAMOVIBILE IN VETRORESINA



www.fisiokinesiterapia.biz

IPERCIFOSI TRATTAMENTO CHIRURGICO

CURVE OLTRE I 70°

INTERVENTO IMPEGNATIVO
E PERICOLOSO

SOLO SE SEGNI NEUROLOGICI O
DOLORE IRRUDICIBILE (cifosi lombare)